

TEXTO DEL PROSPECTO

BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ, Polvo

COMPOSICION: Bicarbonato sódico puro 60 g.

PROPIEDADES: El Bicarbonato sódico es un antiácido con actividad neutralizante del exceso de ácido en el estómago.

TITULAR Y FABRICANTE:

Titular: Novartis Consumer Health S.A., Gran Via de les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona - España.

Fabricado por: Vectem, S.A. Wagner, 22. 08191 Rubí, Barcelona - España.

INDICACIONES: Alivio sintomático de las molestias estomacales relacionadas con hiperacidez (acidez de estómago, ardores).

POSOLOGIA: Polvo: Adultos: 1 cucharadita de café (3 g) disuelta en ½ vaso de agua de 20 minutos a 1 hora después de las principales comidas. No tomar más de 2 dosis al día. Niños: Consultar al médico.

CONTRAINDICACIONES: Consulte a su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, está embarazada, tiene propensión a la retención de agua (edemas), o en general, si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o una dieta con poca sal.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Riesgo de retención de agua (edema). Flatulencia y eructos.

INTERACCIONES: Consulte a su médico si se encuentra tomando otra medicación, porque los antiácidos pueden modificar la acción de otros medicamentos (tetraciclinas, anfetaminas, quinidina, carbonato de litio, sales de hierro). No tomarlo con leche o calcio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES: No utilizarlo más de 2 semanas sin consultar al médico. Este medicamento, por contener 274 mg de sodio por gramo, puede ser perjudicial en pacientes con dietas pobres en sodio.

IMPORTANTE PARA LA MUJER: Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

SINTOMATOLOGIA DE INTOXICACION Y TRATAMIENTO: A grandes dosis o tratamientos continuados: Alcalosis metabólica, que se manifiesta con los siguientes síntomas: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, vómitos, pérdida de apetito. Interrumpir la medicación y consultar al médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Polvo para solución oral
Vía Oral

“Los medicamentos deben mantenerse fuera de alcance y de la vista de los niños”.

Sin receta médica