

SOBREPIN®

SOBREROL

Jarabe

Vía oral



Sobrerol, único componente activo de SOBREPIN®, es una molécula original, obtenida mediante síntesis.

SOBREPIN® es un fármaco de acción mucolítica, caracterizado por una actividad directa sobre la mucosidad respiratoria, disminuyendo su viscosidad y facilitando su expulsión, eliminando así la mucoestasis. Esta acción directa sobre la mucosidad se justifica por los altos niveles de concentración de la sustancia en el pulmón y, asimismo, explica que el producto no reseque las vías respiratorias. SOBREPIN® acelera el efecto de los antibióticos, al favorecer el acceso de los mismos al foco infeccioso.

En resumen SOBREPIN® actúa:

- Reduciendo la viscosidad de las secreciones bronquiales.
- Mejorando el nivel de ventilación pulmonar.
- Favoreciendo la reepitelización de la mucosa respiratoria.

Por consiguiente, SOBREPIN® reduce rápidamente la expectoración, disminuye la tos y la disnea y mejoran o desaparecen los signos obtenidos por la auscultación del tórax.

COMPOSICIÓN

Composición por 100 ml:

Sobrerol 800 mg; Sacarosa 60 g; Etanol 5 g; Metilparabén; Propilparabén; Fosfato sódico dibásico; Glicerol (E-422); Aroma de caramelo; agua desionizada.

INDICACIONES

Afecciones agudas y crónicas del aparato respiratorio con alteraciones de la secreción: rinitis, faringitis, laringotraqueitis, bronquitis aguda, gripe, bronconeumopatías crónicas obstructivas (bronquitis crónica, enfisema, asma).

POSOLOGÍA

Adultos: 2 medidas completas (20 ml) 2 veces al día.

Niños: 1 medida completa (10 ml) 3 veces al día.

Lactantes: 1 medida hasta el nivel inferior (2,5 ml) 2 veces al día (en el biberón).

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIA

Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene 5% de Etanol en volumen final. Cada unidad de toma (10 ml) contiene 0,5 g de Etanol, lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad

hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Este medicamento contiene 6 g de sacarosa por dosis de 10 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Debido al acusado tropismo pulmonar del Sobrerol y a su baja toxicidad, no se conocen los efectos de una intoxicación por este principio activo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIONES

Aerosol: Envase con 10 ampollas de 3 ml.

Cápsulas: Envase con 24 caps.

Jarabe: Frasco con 150 cc y medida dosificadora a 2,5, 5 y 10 cc.

Supositorios Adultos: Envase con 10 supositorios.

Supositorios Infantil: Envase con 10 supositorios.

Supositorios Lactantes: Envase con 10 supositorios.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

SIN RECETA MEDICA



TEDEC-MEJI FARMA, S.A.
Carretera M-300, Km 30,500

28802 Alcalá de Henares, Madrid