



## **LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL**

*Lactobacillus acidophilus*

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o si persisten después de 2 días, debe consultar a un médico.

**En este prospecto encontrará información sobre:**

1. Qué es LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, y para que se utiliza
2. Antes de tomar LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL
3. Como tomar LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

### **LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL**

*Lactobacillus acidophilus*

Cada sobre contiene:

- Como principio activo:

Lactobacillus acidophilus \*(muertos) .....10.000 millones de bacterias  
(como 340 mg de polvo liofilizado de cuerpos bacterianos de *Lactobacillus acidophilus* cepa Lacteol (LB), muertos en su medio de cultivo, fermentado y neutralizado), excipiente c.s

\* Lactobacillus fermentum y Lactobacillus delbrueckii

- Los demás componentes (excipientes) son:

Sacarosa, lactosa, ácido silícico, aroma de plátano naranja, carbonato de calcio (E-170).

#### **LABORATORIO TITULAR**

LABORATORIO RAMÓN SALA,S.L  
C/ París 174 - 174 bis  
08036 Barcelona  
ESPAÑA

#### **RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN**

APTALIS PHARMA S.A.S.  
Route de Bû  
78550 HOUDAN  
FRANCIA

### **1. QUE ES LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL Y PARA QUE SE UTILIZA.**

Este medicamento es un polvo para suspensión oral , se presenta en un envase conteniendo 10 sobres.

Pertenece al grupo de medicamentos denominados antidiarreicos de origen microbiano.

**CORREO ELECTRÓNICO**

Sugerencias\_ft@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID

Está indicado en el tratamiento sintomático de las diarreas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos causados por la destrucción de la flora intestinal, debido a la administración de antibióticos.

## **2. ANTES DE TOMAR LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL.**

### **No tome LACTEOL**

- Si tiene alergia a alguno de los componentes de este medicamento
- Si tiene alergia a la lactosa o a la leche

### **Tenga especial cuidado con LACTEOL :**

En los casos siguientes consulte a su médico para que evalúe la idoneidad del tratamiento:

- Si la diarrea va acompañada de fiebre o vómito
- En caso de presencia de sangre en las deposiciones
- En caso de sed muy intensa o sensación de lengua seca ya que son síntomas de deshidratación
- En niños menores de 6 años, en caso de diarrea con más de 6 deposiciones al día, con una duración de más de 24 horas y/o acompañada de pérdida de peso
- En adultos y niños mayores de 6 años, si no se produce mejora al cabo de 2 días de tratamiento

### **Toma de Lacteol con alimentos y bebidas**

El tratamiento con LACTEOL debe ir asociado a una pauta dietética:

- Toma de bebidas abundantes, durante el día, para compensar la pérdida de líquido
- Dieta astringente adecuada como por ejemplo pescados y carnes asados y arroz, excluyendo grasas, verduras frescas, frutas, platos picantes y alimentos o bebidas heladas.

### **Embarazo:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento

Por carecer de suficientes datos, es preferible no utilizar este medicamento durante el embarazo.

**I m p o r t a n t e  
p a r a l a m u j e r**

**Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su**

### **Lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento

### **Uso en niños**

Para niños menores de 6 años consulte al médico

### **Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito

### **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

## **3. COMO TOMAR LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.  
Este medicamento se administra vía oral

Vierta el polvo en medio vaso de agua, agite hasta completa dispersión e ingiéralo rápidamente. En niños pequeños el polvo puede mezclarse con algún alimento.

Adultos y niños:

La dosis usual es de 1 a 2 sobres al día en función de la gravedad del trastorno. En caso de tomar 2 sobres se repartirán en dos tomas

En diarrea aguda, puede aumentarse la dosis a 3 sobres el primer día de tratamiento repartidas en tres tomas, para seguir con la misma dosis usual (1-2 sobres) durante los días siguientes.

Niños menores de 6 años : Consultar al médico

Si los trastornos no mejoran al cabo de 2 días, consultar con su médico.

Si estima que la acción de Lacteol es demasiado fuerte o débil, comuníquesele a su médico o farmacéutico.

### **Si Usted toma más LACTEOL del que debiera:**

Si usted ha tomado más sobres de los debidos consulte inmediatamente al médico o al farmacéutico o llame al Servicio de Información de Toxicología, teléfono: 91 562 04 020, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó tomar LACTEOL:**



No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamento, Lacteol puede tener efectos adversos.

Aunque no se han observado a las dosis recomendadas efectos adversos con Lacteol, en algunos casos se han descrito los siguientes efectos adversos respecto a los Lactobacillus : erupciones cutáneas, gases, eructos, hipo y estreñimiento.

Si se observa estos o cualquier otro efecto adverso no descrito en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE LACTEOL**

Mantenga Lacteol fuera del alcance y de la vista de los niños.

No se precisan condiciones especiales de conservación

##### **Caducidad**

No utilizar LACTEOL después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

##### **Otras presentaciones**

LACTEOL CÁPSULAS DURAS

**Este prospecto ha sido aprobado:** Noviembre 2003