



PROSPECTO

STIMOL SOLUCIÓN ORAL

COMPOSICIÓN

Cada sobre de 10 ml contiene:

Citrulina, malato..... 1 g

Excipientes: Aroma de esencia de naranja, solución de hidróxido sódico, agua purificada.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

18 sobres con solución oral

ACTIVIDAD

STIMOL SOLUCIÓN ORAL es un producto que proporciona citrulina al organismo. La Citrulina es un aminoácido que juega un papel importante en los procesos de fatiga muscular.

TITULAR Y FABRICANTE

LABORATOIRES BIOCODEX
7 Avenue Gallieni
94250- Gentilly
FRANCE

INDICACIONES

STIMOL SOLUCIÓN ORAL está indicado en el alivio sintomático de la fatiga física pasajera en estados carenciales de aminoácidos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes de la especialidad farmacéutica. Insuficiencia renal o hepática grave.

PRECAUCIONES

No superar la dosis indicada en el apartado posología. Si los síntomas empeoran o duran más de 12 días, consultar al médico.

INTERACCIONES

No se han descrito. Pero si se está tomando otros medicamentos, consulte a su médico o farmacéutico

ADVERTENCIAS

- **Embarazo y lactancia**

Las mujeres en periodo de lactancia, que estén embarazadas o creen que pudieran estarlo deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.

- **Efectos sobre la capacidad de conducción**

No se han descrito.

- **Uso en niños**

Consultar al médico para utilizarlo en menores de 12 años.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

POSOLOGÍA

El tratamiento deberá ser de corta duración (máximo 12 días).

El producto debe administrarse por vía oral.

La posología recomendada es la siguiente:

- **Adultos y ancianos:** La dosis normal es de 3 sobres al día, administrando un sobre durante las principales comidas.
- **Niños mayores de 12 años:** 2 sobres al día.
- **Niños menores de 12 años:** consultar al médico.

INTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Diluir el contenido del sobre en un vaso de agua (aprox. 150 ml) u otro líquido frío o caliente (leche, zumo, etc.) a los que se les puede añadir azúcar, si se quiere.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental puede producirse náuseas, vómitos o diarreas, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos se han observado molestias o dolor de estómago. Raramente nerviosismo. Si se observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN



En condiciones normales.

CADUCIDAD

Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

TEXTO REVISADO: Enero 2.000

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
SIN RECETA MÉDICA