

Acción y mecanismo

Sialagogo, astringente y antiséptico débil. Pertenecce al grupo de los cloratos. Actúa liberando ácido clórico (oxidante) con débil acción antiséptica.

Indicaciones

- Alivio sintomático de la [SEQUEDAD DE BOCA] y la [HALITOSIS] (mal aliento) consecuente.

Posología

Vía tópica:

- Adultos: 200-325 mg (1 comprimido)/2-3 h, hasta un máximo de 8 comprimidos/día.
- Niños mayores de 6 años: 100-162,5 mg (1/2 comprimido)/3 h, hasta un máximo de 4 comprimidos/día.
- Normas para la correcta administración: dejar disolver lentamente en la boca, sin masticar ni tragar.

Precauciones

Evita tratamientos prolongados, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o alteraciones sanguíneas.

Advertencias/consejos

No se debe sobrepasar la dosis diaria de 8 comprimidos en adultos, evitando tratamientos prolongados, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o alteraciones sanguíneas.

No administrar a niños menores de 6 años.

Reacciones adversas

Los efectos adversos de clorato potásico son, en general, infrecuentes aunque moderadamente importantes. Las reacciones adversas más características son:

-Raramente (

Sobredosis

- Síntomas: El clorato potásico es muy tóxico. La dosis mortal es de 5 g en adultos y de 1 g en niños. Una intoxicación aguda puede cursar con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Posteriormente, formación de metahemoglobina (no responde a zul de metileno), anemia hemolítica (hemorragia) e insuficiencia renal. También puede producir convulsiones, daño hepático y coma.

- Tratamiento: lavado gástrico, exanguinotransfusión, bicarbonato (iv) y hemodiálisis.

Principios activos

- **Potasio,clorato:**200 mg. indicaciones: sialagogo. adultos: máx. 8 comprimidos/día. niños mayores de 6 años: mitad de dosis, (máx. 20 mg/dosis y 30 comprimidos/envase). o.m: 17-01-94.

Laboratorio:

Orravan