

Biodramina[®] chicle

(Dimenhidrinato)

Prevención y tratamiento del mareo

Mal des transports – Travel sickness – Reisekrankheit

PROPIEDADES

El dimenhidrinato, principio activo fundamental de la serie BIODRAMINA, es un fármaco de reconocida eficacia en la prevención y el tratamiento del mareo, vértigo, náuseas o vómitos, causados por la locomoción (cinetosis). La respuesta terapéutica se inicia a los 2-3 minutos, ya que la sustancia activa, dimenhidrinato, pasa a la sangre directamente a través de la mucosa bucal, por lo que la BIODRAMINA CHICLE permite el tratamiento inmediato al presentarse el trastorno de forma inesperada.

COMPOSICIÓN

Cada chicle contiene:

Dimenhidrinato (D.C.I.)	20 mg
Sacarina sódica.....	2 mg
Aspartamo (DCI).....	3 mg
Sacarosa.....	410 mg
Glucosa.....	54 mg
Excipiente.....	c.s.

ADVERTENCIA

Pacientes diabéticos: Este medicamento contiene 410 mg de sacarosa por chicle.

Pacientes con fenilcetonuria: Cada chicle contiene 3 mg de aspartamo (derivado de fenilalanina).

INDICACIONES

Mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea. Vértigo.

POSOLOGÍA

1 chicle de BIODRAMINA al presentarse los primeros síntomas. Puede repetirse a las 1-3 horas.

Las personas sensibles a los viajes mascarán un chicle antes de producirse los síntomas.

Para alcanzar todo su efecto, el chicle deberá masticarse durante 5-10 minutos y no debe deglutirse.

BIODRAMINA CHICLE también puede administrarse a niños (mayores de 6 años), a la dosis anteriormente indicada.

CONTRAINDICACIONES

El dimenhidrinato no debe ser administrado sin prescripción facultativa en los siguientes casos: epilepsia, eclampsia, glaucoma, hipertrofia prostática. Está contraindicado en pacientes afectados de fenilcetonuria. No debe utilizarse en niños menores de 6 años, puesto que, al igual que con cualquier chicle, existe el riesgo de que sea tragado por niños pequeños.

INCOMPATIBILIDADES

Las bebidas alcohólicas pueden potenciar la acción del dimenhidrinato, por lo que no se aconseja su utilización simultánea. No asociar con sedantes, tranquilizantes, hipnóticos o antiespasmódicos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente, en algunas personas, puede provocar cierta somnolencia y sequedad de boca.

PRECAUCIONES

No conducir ni manejar maquinaria peligrosa.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

La intoxicación con esta especialidad es rara dado su elevado índice terapéutico. En caso de intoxicación accidental, que sólo puede producirse por ingestión de dosis muy elevadas, se seguirán las pautas generales para favorecer la rápida eliminación de medicamentos (lavado de estómago, aumento de la diuresis). En caso de predominar la depresión se administrarán analépticos.

PRESENTACIÓN

Envases de 6 y 12 chicles.

Manténganse los medicamentos fuera del alcance de los niños

Sin receta médica

Posologie pour prévenir le mal des transports

A l'apparition de symptômes mâcher 1 Biodramina chewing-gum. Pour obtenir l'effet maximal, il faut le mâcher pendant 5-10 minutes. Les personnes particulièrement sensibles prendront Biodramina en entamant un voyage. Répéter la dose en cas d'atténuation des effets du médicament.

Dosage for the prevention of travel sickness

As soon as the first symptoms appear, chew 1 Biodramina chewing-gum. It is recommended to chew Biodramina during 5-10 minutes for reaching its full effect. More sensitive people shall take Biodramina when starting a bad trip. Repeat when the effect is decreasing.

Dosierung zur Verhütung der Reisekrankheit

Bei den ersten Anzeichen von Reisekrankheit wird 1 Biodramina Kaugummi-Dragee gekaut. Um volle Wirksamkeit zu erreichen, sollte 5-10 Minuten lang gekaut werden. Besonders reiseempfindliche Personen kauen Biodramina bei Antritt einer Reise. Bei Nachlassen der Wirkung können dann weitere Biodramina gekaut werden.

URIACH OTC, SL

Av. Camí Reial 51-57; 08184 Palau-solità I Plegamans (Barcelona-España)
