



CHICLIDA COMPRIMIDOS PARA CHUPAR

(Meclozina)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL MAREO

La Meclozina principio activo de CHICLIDA COMPRIMIDOS PARA CHUPAR, es un fármaco dotado de una prolongada acción antihistamínica, que ha demostrado una alta eficacia en la prevención de los mareos provocados por cualquier medio de locomoción.

PRESENTACIÓN: Envases de 6 comprimidos para chupar.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO: 25 mg Hidrocloruro de Meclozina. Excipientes: glucosa, sacarosa, esencia de menta y estearato de magnesio.

INDICACIONES: Mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía oral.

POSOLOGÍA: Adultos: 1 ó 2 comprimidos media hora antes de iniciar el viaje. Niños de 6 a 12 años: 1 comprimido media hora antes de iniciar el viaje.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la Meclozina o a cualquiera de sus excipientes. Glaucoma. Hipertrofia prostática. Enfermedad obstructiva de los tractos gastrointestinal o urinario. Asma bronquial. Diabetes. Niños menores de 6 años.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES: Las bebidas alcohólicas y los tranquilizantes pueden potenciar la acción de la Meclozina, por lo que no se aconseja su utilización simultánea.

EFFECTOS SECUNDARIOS: En algunas personas puede provocar somnolencia, fatiga. Raramente sequedad de boca, visión borrosa. Si se observan estas o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Debido a que puede producir somnolencia, se recomienda no conducir ni manejar maquinaria peligrosa. **ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:** Este medicamento contiene 975 mg de glucosa y 975 mg de sacarosa, por lo que no debe de ser administrado a pacientes diabéticos.

EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. La administración de CHICLIDA COMPRIMIDOS PARA CHUPAR en el embarazo o la lactancia deben hacerse bajo supervisión médica.

"IMPORTANTE PARA LA MUJER": Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe de ser vigilado por su médico*.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: La intoxicación con esta especialidad es rara dado su elevado índice terapéutico. En caso de intoxicación accidental, que solo puede producirse por ingestión de dosis muy elevadas, se seguirán las pautas generales para favorecer la rápida eliminación de medicamentos (lavado de estómago, aumento de la diuresis). En caso de predominar la depresión se administrarán analépticos. En caso de sobredosis o ingestión de grandes cantidades, consultar al médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida

No utilizar CHICLIDA COMPRIMIDOS PARA CHUPAR después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

SIN RECETA MÉDICA.

MANTENGA CHICLIDA COMPRIMIDOS PARA CHUPAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DR TORRENTS, S. A. Lab. Farm. n° 3080
OLESA DE BONESVALLS (Barcelona)
Director Técnico: Rafael Aznar Aznar